

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ К ЭНДОСКОПИЧЕСКОМУ ИССЛЕДОВАНИЮ (КОЛОНОСКОПИЯ), ТРЕБУЮЩЕМУ ОТСУТСТВИЯ СОДЕРЖИМОГО В ТОЛСТОЙ КИШКЕ

От качества подготовки кишечника зависит успех проводимого исследования, то есть точность постановки диагноза и скорость реабилитации. Поэтому важно тщательно следовать указанным шагам и рекомендациям по подготовке к исследованиям и приему препарата.

КАЧЕСТВЕННАЯ ПОДГОТОВКА КИШЕЧНИКА - ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ПАЦИЕНТА!

1 ШАГ: за 5-7 дней до исследования необходимо отказаться от **активированного угля, кроворазжижающих** (аспирин, тромбоасс, кардиомагнил и т.п.) и **железосодержащих** препаратов (в случае приема). Прием других препаратов, если прием осуществляется постоянно, необходимо продолжить.

2 ШАГ: БЕСШЛАКОВАЯ ДИЕТА за 2-3 дня до начала приема очищающего препарата

РАЗРЕШЕНО	ЗАПРЕЩЕНО
<ul style="list-style-type: none">бульоны (прозрачные, процеженные);мясо, птица и рыба нежирных сортов (в отварном, паровом или тушёном виде);яйца, сыр, сливочное масло, йогурт и кисломолочные продукты без добавок и наполнителей;сахар, мед (не в сотах);чай, соки без мякоти. <p>Разрешенные продукты и жидкости не должны содержать мелкие косточки, зерна, семена, отруби</p>	<ul style="list-style-type: none">все хлебобулочные, мучные и макаронные изделия;овощи, в том числе картофель, зелень, грибы, морская капуста;крупы, каши, бобовые, злаковые, орехи, семечки, кунжут, мак, зерна, отруби и другие семена;консервы, все соленые, специи и острые приправы;копчености, сосиски, колбасы, морепродукты;чипсы, гамбургеры, шоколад;фрукты, ягоды, в том числе сухофрукты, варенье, джем, мармелад, желе;алкоголь, квас, газированные напитки молоко, кисель, компот;любые другие продукты и жидкости, не входящие в список разрешённых.
<p>Накануне дня исследования должен быть ТОЛЬКО ОБЕД из списка разрешенных продуктов и жидкостей, НЕ УЖИНАТЬ!!!</p>	

ШАГ 3: Если пациент страдает запорами, необходимо в течении 3х дней до очищения кишечника принимать слабительные препараты, которые обычно используются пациентом.

ШАГ 4: ОДНОЭТАПНЫЙ ВЕЧЕРНИЙ ПРИЕМ ОЧИЩАЮЩЕГО ПРЕПАРАТА «МОВИПРЕП»

День накануне исследования:

- завтрак и обед согласно списку разрешённых продуктов и жидкостей;

- УЖИНА НЕТ;
- с 19:00 до 20:30 принять **первый** литр раствора препарата «МОВИПРЕП» (содержимое одного пакетика (саше) А и одного пакетика (саше) Б полностью растворить в небольшом количестве питьевой воды комнатной температуры (без газов), добавить в раствор питьевой воды (без газов) до 1 литра, хорошо перемешать, разлить по 4 стаканам (см. инструкцию к препарату МОВИПРЕП)): принимать по одному стакану каждые 15 минут, в промежутках выпивать 3-4 глотка питьевой воды без газов. Таким образом, на прием 1 литра препарата придется прием 0,5 литра воды.
- с 21:00 до 22:30 принять **второй** литр раствора препарата «МОВИПРЕП» (содержимое второго пакетика (саше) А и второго пакетика (саше) Б полностью растворить в небольшом количестве питьевой воды комнатной температуры (без газов), добавить в раствор $\frac{1}{2}$ флакона жидкого препарата «ЭСПУМИЗАН» (флакон 30 мл.), добавить в раствор питьевой воды (без газов) до 1 литра, хорошо перемешать, разлить по 4 стаканам (см. инструкцию к препарату МОВИПРЕП)): принимать по одному стакану каждые 15 минут, в промежутках выпивать 3-4 глотка обычной воды без газов. Таким образом, на прием 1 литра препарата придется прием 0,5 литра воды.

В случае невозможности подготовки (рвота после приема препарата и т.п.) просим связаться с нами по телефону (495) 121-04-03 до 21:00 с понедельника по субботу.

Подготовка считается завершенной, когда стул представляет собой полупрозрачную жидкость желтоватого цвета без каловых масс.

В случае приема жизненно важных препаратов, от которых нельзя отказаться необходимо принять их не позднее, чем за 4 часа до исследования, запив одним глотком питьевой воды без газов, от всех остальных препаратов до исследования необходимо отказаться и принять их через час после исследования. **За 4 часа до исследования НЕ ПИТЬ!!!**

!!! Если планируется проведение колоноскопии и гастроскопии одновременно – прием любых препаратов необходимо отложить до завершения исследований.

В день проведения исследования необходимо иметь при себе:

- электрокардиограмму (ЭКГ) с расшифровкой сроком давности не более 1 мес. для пациентов, проходящих исследование под седацией (медикаментозный сон) **в возрасте от 40 лет и для пациентов, проходящих исследование без седации (медикаментозный сон) в возрасте от 50 лет;**
- результаты анализов на инфекционную группу: ВИЧ, сифилис (RW), гепатит В и С сроком давности не более 6 мес.;
- результаты предыдущих исследований (при наличии).